

Zorgprogramma COPD	Landelijk gemiddelde 2022	2022	2021	2020	2019	2018
Prevalentie	1,90 %	1,52 %	1,70 %	1,75 %	1,80 %	1,83 %
Percentage patiënten met hoofdbehandelaar specialist	24,81 %	14,44 %	5,54 %	4,79 %	4,16 %	3,97 %
Percentage patiënten in eerste lijn, maar niet in zorgprogramma	15,37 %	20,85 %	21,83 %	20,99 %	18,40 %	16,03 %
Percentage patiënten in zorgprogramma	47,15 %	52,12 %	45,92 %	45,40 %	49,09 %	50,35 %
Percentage patiënten zonder hoofdbehandelaar	10,83 %	12,58 %	26,71 %	28,82 %	28,35 %	29,65 %
Percentage patiënten met inhalatiemedicatie bij wie inhalatietechniek is gecontroleerd	58,89 %	57,10 %	39,63 %	23,61 %	41,24 %	39,01 %
Percentage patiënten bij wie functioneren (MRC of CCQ) is vastgelegd	65,87 %	62,76 %	42,94 %	28,17 %	45,91 %	43,61 %
Percentage patiënten bij wie mate van bewegen is gecontroleerd	70,89 %	64,38 %	51,31 %	35,85 %	46,29 %	41,68 %
Percentage patiënten van wie het rookgedrag is vastgelegd	77,37 %	72,48 %	60,28 %	46,54 %	57,48 %	56,71 %
Percentage patiënten dat rookt	35,42%	29,55 %	29,93 %	28,42 %	31,15 %	32,31 %
Percentage patiënten met twee of meer longaanvallen	2,68 %	2,46 %	3,97 %	5,83 %	6,37 %	6,58 %

Prevalentie COPD

