

Omzettingsschema GLP-1-agonisten

Een gevalideerd, evidence onderbouwd, omzettingsschema voor GLP-1-agonisten is niet aanwezig.

Vooraf daarom het volgende, behoudende, advies.

- Overstap van semaglutide (sc) naar dulaglutide (sc): start lager dan de vergelijking zoals genoemd in het SmPC
- Overstap van semaglutide (sc) naar semaglutide (po): start lager dan de vergelijking zoals genoemd in het SmPC

Welke gegevens zijn wel beschikbaar?

- 1- De gegevens in de kolommen SmPC zijn gebaseerd op de informatie uit de SmPC's van de diverse GLP-1-agonisten.
- 2- In het SmPC van Rybelsus (semaglutide po) is de volgende vergelijking tussen oraal en sc semaglutide opgenomen:
Semaglutide (po) 1 dd 14 mg = semaglutide (sc) 1 maal per week 0,5 mg
Er is geen vergelijking beschikbaar van semaglutide (sc) 1 maal per week 1 mg met semaglutide (po).
- 3- De gegevens uit de literatuur. Zie hiervoor de kolommen met de titel ref 1 en 2.
Het aantal vergelijkende studies van GLP-1-agonisten is beperkt. De gegevens uit de literatuur geven aan dat de omzetting van semaglutide SC naar dulaglutide SC, volgens SmPC vergelijking, aan de hoge kant lijkt.

Omzettingsschema GLP-1-agonisten

generieke naam	spécialité	tdw	frequentie	start dosis	midden dosis		max dosis	lage dosis	hoge dosis	opmerking
				SmPC	SmPC	SmPC	SmPC	ref 1 en 2	ref 1 en 2	
semaglutide	Ozempic	SC	1 keer per week	0,25 mg	0,5 mg	1,0 mg	2 mg	0,5 mg	1,0 mg	
semaglutide	Rybelsus	oraal	1 keer per dag	3 mg	14 mg	?	?			
dulaglutide	Trulicity	SC	1 keer per week	1,5 mg	3 mg	3 mg	4,5 mg	0,75-1,5 mg	1,5 mg	monotherapie 0,75 mg
liraglutide	Victoza	SC	1 keer per dag	0,6 mg	1,2 mg	1,2 mg	1,8 mg			Saxenda = voor ind obesitas
lixisenatide	Lyxumia	SC	1 keer per dag	10 microg			20 microg			niet vergoed bij zeer hoog risico HVZ pat
weekdosis										
referenties:	https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7566932/#!po=36.6667 https://www.novomedlink.com/diabetes/products/treatments/ozempic/efficacy-safety/ozempic-vs-trulicity.html									

04 oktober 2022