






























Voor medicatie stap ophogen bespreek: Therapietrouw Inhalatie techniek Prikfels	Stap 1: SABA en/of SAMA zo nodig	Stap 2: LABA of LAMA	Stap 3: combinatie LABA en LAMA	Stap 4: Alleen bij persisterende exacerbaties ondanks LABA/LAMA. Triple therapie mag i.o.m. kaderhuisarts of longarts worden voorgeschreven. Huisarts mag herhaalrecept uitschrijven.
<p>Aerosol <i>Weerstand laag</i></p> <p>Een aerosol moet met voorzetkamer gebruikt worden. Bijvoorbeeld Aerochamber</p>  <p>Of</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Salbutamol (Salbutamol/Ventolin) SABA 100 mcg 1-4dd 2 Zn 800 mcg/dag • Ipratropium (Ipratropium/Atrovent) SAMA 20 mcg 1-4dd 2 Max 240 mcg/dag  	<p>En zo nodig SABA/ SAMA (t/m stap 4) </p> <ul style="list-style-type: none"> • Formoterol (Formoterol/Atimos) LABA 12 mcg 1-2dd 1 Max 24 mcg/keer en 48mcg/dag • Salmeterol (Serevent) LABA 25 mcg 2dd 2 Max 100 mcg/dag Ernstige luchtwegobstructie: 2xdd 100 mcg  	<ul style="list-style-type: none"> • Formoterol/Glycopyrronium (Bevespi) LABA/LAMA 7,2/5 mcg 2dd 2 	<ul style="list-style-type: none"> • Stap 3 en Budesonide e.f. (Budesonide) ICS 200 mcg 2dd 1 • Stap 3 en Fluticason (Fluticason/Flixotide) ICS 250 mcg 2dd 2 • Beclometason-Formoterol e.f. (Foster) ICS/LABA ->voeg LAMA toe! 100/6 mcg 2dd 2 • Beclometason/Formoterol/ Glycopyrronium (Tribow) Laba/Lama/ICS 87/5/9 mcg 2dd2 • Formoterol/Glycopyrronium/ Budesonide (Trixeo) Laba/Lama/ICS 5/7,2/160 mcg 2dd2     
<p>Respimat <i>Weerstand laag</i></p>		<ul style="list-style-type: none"> • Olodaterol (Striverdi) LABA 2,5mcg 1dd 2 • Tiotropium, 2,5 (Spiriva) LAMA 2,5 mcg 1dd 2  	<ul style="list-style-type: none"> • Tiotropium/Olodaterol (Spiolto) LABA/LAMA 2,5/2,5 mcg 1dd 2 	
<p>Novolizer <i>Weerstand: middel</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Salbutamol (Salbutamol) SABA 100 mcg 1-4dd 1 Zn max 800mcg/dag 	<ul style="list-style-type: none"> • Formoterol (Formoterol) LABA 12 mcg 1-2dd 1 Max 48 mcg/dag 		<ul style="list-style-type: none"> • Stap 3 en Budesonide (MP, Budesonide) ICS 200 mcg 2dd 2 
<p>Genuair <i>Weerstand middel</i></p>		<ul style="list-style-type: none"> • Aclidinium (Eklira) LAMA 322 mcg 2dd 1 	<ul style="list-style-type: none"> • Aclidinium/formoterol (Duaklir) LABA/LAMA 340/12 mcg 2dd 1 	
<p>Diskus <i>Weerstand middel</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Salbutamol (Ventolin) SABA 200 mcg 1-4dd 1 Zn max 800mcg/dag 	<ul style="list-style-type: none"> • Salmeterol (Serevent) LABA 50 mcg 2dd 1 Max 2x100 mcg/dd 		<ul style="list-style-type: none"> • Stap 3 en Fluticasonpropionaat (Flixotide) ICS 500 mcg 2dd 1 
<p>Ellipta <i>Weerstand: middel</i></p>		<ul style="list-style-type: none"> • Umeclidinium (Incruse) LAMA 55 mcg 1xdd 1 	<ul style="list-style-type: none"> • Umeclidinium/Vilanterol (Anoro) LABA/LAMA 55/22 mcg 1dd 1 	<ul style="list-style-type: none"> • Stap 2 en Fluticason-Vilanterol (Relvar) ICS/LABA 92/22 mcg 1dd 1 • Stap 2 en Fluticason-Vilanterol (Trelegy) ICS/LABA 92/22 mcg 1dd 1  

Advies; gebruik de Incheck Dial;  meet de hoogste inspiratoire flow-snelheid en kan de weerstandskennmerken van de specifieke inhalator van een patiënt meten.

Voor medicatie opgevoegen bespreek: Therapietrouw, Inhalatie techniek Prikkels.	Stap 1 (optioneel) SABA zonodig of lage dosis ICS –Formoterol zo nodig	Stap 2: lage dosis ICS of lage dosis ICS-Formoterol, zo nodig	Stap 3: lage dosis ICS + LABA of intermediaire dosis ICS (zonder LABA)	Stap 4: Intermediaire tot hoge dosis ICS-LABA of hogere dosering ICS (zonder LABA)
En zo nodig en per elke stap ICS-Formoterol dosis aanpassen				
Aerosol <i>Weerstand Laag</i> Een aerosol moet met voorzetskamer gebruikt worden. Bijvoorbeeld; Aerochamber of Vortex	<ul style="list-style-type: none"> • Beclometason-Formoterol e.f. (Foster) ICS/LABA 100/6 mcg 2dd 1-2 200/6 mcg 2dd 1, max 4 • Fluticason-Formoterol (Flutiform) ICS/LABA 50/5 mcg 2dd 2 125/5 mcg 2dd 2 250/10 mcg 2dd 2, max 2 • Salbutamol (Salbutamol/Ventolin) SABA 100 mcg 1-4dd 1-2 Max 800 mcg per dag 	<ul style="list-style-type: none"> • Beclometason-Formoterol e.f. (Foster) ICS/LABA Zie stap 1 • Fluticason-Formoterol (Flutiform) ICS/LABA Zie stap 1 • Fluticason (Fluticason/Flixotide) ICS 125 mcg 2dd 1 Zn 250 mcg 2dd 1 Max 500 mcg 2dd 1 • Budesonide e.f. (Budesonide) ICS 200 mcg 2dd 1-2 Max 800 mcg per dag 	<ul style="list-style-type: none"> • Beclometason-Formoterol e.f. (Foster) ICS/LABA Zie stap 1 • Fluticason-Formoterol (Flutiform) ICS/LABA Zie stap 1 • Fluticason (Fluticason/Flixotide) ICS Zie stap 2 • Budesonide e.f. (Budesonide) ICS Zie stap 2 	<ul style="list-style-type: none"> • Beclometason-Formoterol e.f. (Foster) ICS/LABA Zie stap 1 • Fluticason-Formoterol (Flutiform) ICS/LABA Zie stap 1 • Fluticason (Fluticason/Flixotide) ICS Zie stap 2 • Budesonide e.f. (Budesonide) ICS Zie stap 2
Novolizer <i>Weerstand middel</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Salbutamol (Salbutamol) SABA 100 mcg zn 1-4dd 1-2 Max 800 mcg per dag 	<ul style="list-style-type: none"> • Budesonide (Budesonide) ICS 200 mcg 2dd 1 Zn 2dd 2 (5-14 dagen) Max 800 mcg per dag 	<ul style="list-style-type: none"> • Budesonide (Budesonide) ICS Zie stap 2 	<ul style="list-style-type: none"> • Budesonide (Budesonide) ICS Zie stap 2
Diskus <i>Weerstand middel</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Salbutamol (Ventolin) SABA 200 mcg zn, 1-4dd 1 Max 800 mcg per dag 	<ul style="list-style-type: none"> • Fluticasonpropionaat (Flixotide) ICS 250 mcg 2dd 1 Tijdelijk max 500 mcg 2dd 1 	<ul style="list-style-type: none"> • Fluticasonpropionaat (Flixotide) ICS Zie stap 2 	<ul style="list-style-type: none"> • Fluticasonpropionaat (Flixotide) ICS Zie stap 2
Ellipta <i>Weerstand middel</i>			<ul style="list-style-type: none"> • Fluticason-Vilanterol (Relvar) ICS/LABA 92/22 mcg 1dd 1 184/22 mcg 1dd 1 	<ul style="list-style-type: none"> • Fluticason-Vilanterol (Relvar) ICS/LABA Zie stap 3
NEXThaler <i>Weerstand middel</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Beclometason-Formoterol (Foster) ICS/LABA 100/6 mcg 2dd 1-2 Zn 200/6 mcg 2dd 1, max 800/24 mcg per dag 	<ul style="list-style-type: none"> • Beclometason-Formoterol (Foster) ICS/LABA Zie stap 1 	<ul style="list-style-type: none"> • Beclometason-Formoterol (Foster) ICS/LABA Zie stap 1 	<ul style="list-style-type: none"> • Beclometason-Formoterol (Foster) ICS/LABA Zie stap 1

Advies; gebruik de Incheck Dial; meet de hoogste inspiratoire flow-snelheid en kan de weerstandskennmerken van de specifieke inhalator van een patiënt meten.